

United Community Health Center – 2008/2009 Flu Consent Form

Nombre _____ MR# _____

Dirección _____ Ciudad _____ Estado _____

Fecha de nacimiento _____ Edad _____ Sexo: M F

Si es menor nombre del padre: _____

Algunas personas no deben vacunarse. Las contraindicaciones incluyen personas con alergias severas a los huevos (la vacuna de influenza crece en huevos de gallina) o en algún otro componente de la vacuna. (Por ejemplo, thimerosal, es un componente orgánico que contiene mercurio). Mercurio es un químico utilizado ampliamente como preservante en muchos productos biológicos y médicos, incluyendo ciertas vacunas y soluciones, Para lentes de contacto). Personas que tengan una enfermedad moderada o severa al momento de la vacunación (no incluye enfermedades menores).

Consulte a su médico antes de vacunarse si usted es alérgico a los huevos o algunos otros componentes de la vacuna, ha tenido alguna vez una reacción alérgica a una vacuna contra la fiebre o a alguna vacuna similar, ha desarrollado el síndrome de Guillan-Barre (GBS), o alguna enfermedad con parálisis severa, dentro de los seis meses después de usted haber recibido la vacuna en el pasado. Esta vacuna no es proveída para los niños menos de seis meses de edad. Además note que si su sistema inmunológico se encuentra comprometido con una enfermedad al momento de la vacunación, puede que su cuerpo no responda de la manera debida para generar anticuerpos que lo protejan contra la gripe. **El efecto secundario mas común de la vacuna contra la gripe es el dolor en el lugar de la inyección**, el cual puede durar hasta dos días pero generalmente no afecta la habilidad del individuo de realizar actividades diarias normales. Algunas personas, en general niños y otras personas que no han sido expuestos antes al virus de influenza, pueden notar síntomas gripales “menores”, tales como, fiebre malestar y debilidad muscular, después de recibir la vacuna contra la gripe. Estos síntomas generalmente empiezan de 6 a 12 horas después de ser vacunado y pueden durar hasta dos días. **Los efectos secundarios menos comunes incluyen reacciones alérgicas y el síndrome de Guillan-Barré (GBS).** Las reacciones alérgicas que puedan ser fatales, generalmente ocurren inmediatamente y son muy raras pero posibles en individuos alérgicos a cualquier componente de la vacuna. En 1976 Swine se asoció a la vacuna contra la gripe con el aumento de casos de GBS. Desde entonces, se estima que el riesgo es muy bajo, de uno a dos casos por millón de personas vacunadas, por lo cual es mucho menor que el riesgo de contraer la gripe.

1. **Ha recibido alguna vez la vacuna contra la gripe?** ____ Sí ____ No
2. **Es alérgico a los huevos o a los productos derivados del huevo?** Si ____ No ____
3. **Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a la vacuna contra la gripe o alguna otra vacuna?** ____ Si ____ No
4. **Existe la posibilidad de que usted este embarazada?** ____ Si ____ No

La vacuna contra la gripe está considerada segura para las mujeres embarazadas, mujeres lactando sus infantes. Se les recomienda a las mujeres que están embarazadas en época de gripe ya que tienen un mayor riesgo de contraer complicaciones.

5. **Esta actualmente enfermo (no incluye enfermedades menores)?** ____ Si ____ No
6. **Usted tiene un historial de tener el síndrome de Guillain-Barre?** Si ____ No ____

He recibido y comprendo la(s) hoja(s) informativa(s) sobre la vacuna contra la gripe, la cual deseo recibir, he tenido la oportunidad de hacer preguntas. He tenido la total oportunidad de leer y considerar el Aviso de Prácticas de Privacidad de los servicios de Vacunación.

Firma _____ Fecha _____

Administered by _____ Lot# _____ R L Deltoid IM